

نام واکسن: آویفا - آر تی آی



گونه هدف: بوقلمون، طیور

نوع واکسن: زنده، اصلاح شده

مورد مصرف: ایجاد ایمنی علیه عفونت رینوتراکئیت در

بوقلمون‌ها و سندرم تورم سر در مرغان

نحوه مصرف: اسپری، قطره چشمی، آشامیدنی

شرایط نگهداری: برودت ۲ الی ۸ درجه سانتی گراد

بسته بندی: ویال های ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ دزی

تولید کننده: بوهرینگر اینگلهایم - فرانسه



## آ.وی. فا- آر تی آی

واکسن زنده و تخفیف حدت داده شده و لیوفیلیزه

علیه عفونت رینوتراکئیت در بوقلمون‌ها و سندرم تورم سر در مرغان TRT/ SHS

### مشخصات واکسن:

ترکیب واکسن: هر دز از واکسن شامل  $10^{2.3} \text{CCID}_{50}$  ویروس رینوتراکئیت TRT/SHS سروتیپ VCO3 می‌باشد. بذر ویروس واکسن زنده آ.وی. فا از بوقلمون جدا سازی شده است.

### موارد مصرف:

ایجاد ایمنی فعال علیه عفونت رینوتراکئیت در بوقلمون‌ها، و به عنوان واکسیناسیون اولیه در پولت‌های مادر و تخمگذار تجارتي علیه سندرم تورم سر ART/SHS مصرف می‌گردد.

### نحوه مصرف:

واکسن زنده آ.وی. فا- آر تی آی (Aviffa Rti) به روش‌های اسپری، قطره چشمی و از طریق آب آشامیدنی در جوجه‌ها قابل مصرف می‌باشد.

### برنامه واکسیناسیون:

بوقلمون: اولین واکسیناسیون در سن یک روزگی، دومین واکسیناسیون در سن ۳ هفتگی، و تکرار واکسیناسیون در سنین ۷ تا ۹ هفتگی انجام شود. در پولت مادر و تخمگذار تجارتي: اولین واکسیناسیون در سن ۱۰ هفتگی تجویز شود. استفاده از واکسن کشته روغنی (TRT) در پولت‌های مادر، تخمگذار تجارتي و بوقلمون به منظور کنترل بیماری در دوران تولید ۳-۴ هفته قبل از آغاز تخم گذاری ضروری است. توصیه: واکسن را با توجه به تجویز دامپزشک فارم و وضعیت بیماری در منطقه مورد استفاده قرار دهید.

### شرایط نگهداری و حمل:

ویال‌های محتوی واکسن را در دمای ۲ الی ۸ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری و حمل نمایید.

### بسته بندی:

این محصول در ویال‌های ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ دزی به بازار عرضه می‌گردد.

شرکت تولید کننده: بوهرینگر اینگلهایم فرانسه

توجه: جهت کسب اطلاعات بیشتر به بروشور واکسن مراجعه نمائید