

نام واکسن : گالیمون اس ئی + اس تی



گونه هدف : طیور

نوع واکسن : غیر فعال (سوسپانسیون روغنی)

مورد مصرف : ایجاد ایمنی علیه عفونت سالمونلای ناشی از

سالمونلا آنتریتیدیس و تیفی موریوم

نحوه مصرف : تزریقی (زیر جلدی یا عضلانی)

شرایط نگهداری : برودت ۲ الی ۸ درجه سانتی گراد

بسته بندی : بطری های ۱۰۰۰ دزی

تولید کننده : بوهرینگر اینگلهایم - فرانسه



## گالیمون اس ئی + اس تی

واکسن غیر فعال برای ایجاد ایمنی فعال علیه سالمونلا آنتریتیدیس + سالمونلا تیفی موریوم در پولت های تخمگذار تجارتي و مادر

### مشخصات واکسن:

ترکیب: هر دز از واکسن شامل باکتری های غیر فعال به شرح زیر می باشد:

- سالمونلا آنتریتیدیس PT4: at least 171 SAT.U

- سالمونلا تیفی موریوم DT104: at least 149 SAT.U

واکسن گالیمون SE+ST غیر فعال بوده و به شکل امولسیون روغنی تولید و عرضه می گردد.

### موارد مصرف:

این واکسن برای ایجاد ایمنی فعال علیه عفونت سالمونلای ناشی از سالمونلا آنتریتیدیس (SE) و سالمونلا تیفی موریوم (ST) در مرغان تخمگذار برای پولت های مادر و تخمگذار تجارتي تجویز می گردد. کاهش کلونیزه شدن میکرواورگانسیم در رودها، کاهش دفع باکتری از طریق مدفوع و کاهش انتقال عمودی (سالمونلا آنتریتیدیس) از تخمدان ها از جمله منافع استفاده از واکسن می باشد.

برنامه واکسیناسیون : واکسیناسیون در پولت های مادر و تخمگذار تجارتي دو نوبت انجام می پذیرد

نوبت اول مصرف واکسن گالیمون SE+ST در سن ۶ هفتگی و نوبت دوم در سن ۱۶ هفتگی توصیه می گردد.

توجه: این واکسن را دو هفته قبل از شروع تخمگذاری و در دوره تولید در گله های مادر و تخمگذار تجارتي استفاده نکنید.

روش و مقدار مصرف: مقدار ۰/۳ میلی لیتر (یک دز) به روش تزریق عضلانی در هر پرنده مصرف نمایند.

شرایط حمل و نگهداری: بطری های محتوی واکسن گالیمون SE+ST در دمای +۲ الی +۸ درجه سانتی گراد نگهداری و حمل گردد. از

منجمد نمودن واکسن خوداری شود.

بسته بندی: واکسن Gallimune SE+ST در بطری های ۳۰۰ میلی لیتری (۱۰۰۰ دزی) به بازار عرضه می گردد.

شرکت تولید کننده : بوهرینگر اینگلهایم - فرانسه

توجه : جهت کسب اطلاعات بیشتر به بروشور واکسن مراجعه نمایید.