



نام واکسن : ری بی زین

گونه هدف : سگ ، گربه ، گاو ، گوسفند ، اسب و فررت Ferret

نوع واکسن : غیر فعال

مورد مصرف : ایجاد ایمنی علیه بیماری هاری

نحوه مصرف : تزریقی (زیر جلدی یا عضلانی)

توجه: در اسب واکسن را به روش زیر جلدی مصرف ننمایید..

شرایط نگهداری : برودت ۲ الی ۸ درجه سانتی گراد

بسته بندی : ویال های یک دزی

تولید کننده : بوهرینگر اینگلهایم-فرانسه



ری بی زین

واکسن غیر فعال علیه بیماری هاری در تمام گونه های حیوانات

مشخصات واکسن

ترکیب: هر دز از واکسن ری بی زین حاوی حداقل 1.1U گلیکوپروتئین های ویروس هاری می باشد.

موارد مصرف: واکسن ری بی زین را می توان علیه بیماری هاری در سگ ، گربه ، گاو ، گوسفند و اسب بکار برد.

مقدار و روش مصرف:

- در سگ و گربه مقدار ۱ میلی لیتر (یک دز) واکسن ری بی زین به روش زیر جلدی یا داخل عضلانی مصرف گردد.
اولین واکسیناسیون در سن هفتگی ۱۲ ، واکسن یاد آور آن یکسال بعد و سپس هر ۳ سال یکبار نسبت به واکسیناسیون حیوان اقدام گردد،
(واکسیناسیون علیه بیماری هاری بر اساس دستورالعمل و قوانین دامپزشکی در هر کشوری انجام می پذیرد)

- در اسب اولین تزریق در ۴ ماهگی و دومین تزریق یک ماه بعد انجام می شود سپس به صورت سالیانه تکرار می شود. یا اولین تزریق در ۶ ماهگی انجام شده و سپس سالیانه تکرار می گردد.

- در گاو و گوسفند (کمتر از ۹ ماه) اولین تزریق در ۴ ماهگی و دومین تزریق بین ۹ تا ۱۲ ماهگی ، سپس سالیانه تکرار میگردد. و در گاو و گوسفند (از ۹ ماهگی) یک تزریق در ۹ ماهگی سپس سالیانه تکرار گردد.

منع مصرف:

- * واکسن را به روش زیر جلدی در اسب استفاده نکنید.
- * فقط حیوانات سالم را واکسینه نمایید، ۱۰ روز قبل از واکسیناسیون نسبت به درمان آلودگی انگلی اقدام گردد.

عوارض جانبی:

- * در صورت بروز واکنش ازدیاد حساسیت پس از تزریق واکسن، نسبت به درمان علامتی حیوان اقدام نمائید.
- به علت وجود هیدروکسید آلومینیوم در واکسن ممکن است در محل تزریق یک برجستگی (Nodule) موقت و زودگذر ایجاد شود.

شرایط حمل و نگهداری:

واکسن را در برودت ۲+ الی ۸+ درجه سانتی گراد (در یخچال) و دور از نور خورشید حمل و نگهداری گردد.

بسته بندی: واکسن ری بی زین در ویال های یک دزی به بازار عرضه می گردد.

شرکت تولید کننده : بوهرینگر اینگلهایم-فرانسه

توجه : جهت کسب اطلاعات بیشتر به بروشور واکسن مراجعه نمائید.