

نام واکسن: بیو لارنگو پی.وی



گونه هدف: طیور

نوع واکسن: زنده - اصلاح شده

مورد مصرف: ایجاد ایمنی علیه بیماری لارنگوتراکئیت طیور

نحوه مصرف: قطره چشمی

شرایط نگهداری: برودت ۲ الی ۸ درجه سانتی گراد

بسته بندی: ویال های ۱۰۰۰ دزی به همراه حلال

تولید کننده: بوهرینگر اینگلهایم-ایتالیا



بیولارنگو پی وی

واکسن زنده و لیوفیلیزه علیه بیماری لارنگوتراکئیت عفونی طیور

مشخصات واکسن

ترکیب:

هر دز از واکسن شامل حداقل $10^{2.5} \text{EID}_{50}$ ویروس تخفیف حدت یافته PV09 می باشد ویروس واکسینال، بر روی مایع کوریوآلانتوئیک جنین تخم مرغ های SPF تکثیر یافته و سپس با ماده ای پایدار، لیوفیلیزه گردیده است.

موارد مصرف:

واکسن بیولارنگو پی وی، برای واکسیناسیون طیور علیه بیماری لارنگوتراکئیت عفونی توصیه می گردد.

نحوه مصرف:

این واکسن به روش قطره چشمی توصیه شده است، در صورت تجویز به روش آشامیدنی، جوجه ها از سطح محافظت پائین تری برخوردار می گردند و یکنواختی در این روش کمتر از قطره چشمی می باشد.

* **روش قطره چشمی:** پس از مخلوط نمودن حلال به ویال محتوی واکسن فقط یک قطره از واکسن را در یک چشم پرنده بچکانید. اجازه دهید قطره در چشم پرنده پخش گردد و سپس پرنده را آزاد کند.

برنامه واکسیناسیون:

* پولت های مادر و تخمگذار تجارتي: تجویز واکسن می بایست از سن ۸ هفتگی تا ۲۰ هفتگی صورت پذیرد. واکسیناسیون پولت های جایگزین در مرغداری های با آلودگی بالا در دو مرحله و در سنین ۶-۷ و ۱۶ هفتگی بهترین پوشش محافظت را ایجاد می کند. واکنش های طبیعی مانند تورم و قرمز شدن چشم، پلک و بافت های اطراف آن متعاقب مصرف واکسن مشاهده می شود. این واکنش های التهابی، ظرف مدت ۳-۵ روز محو می گردند.

توصیه: واکسن را با توجه به تجویز دامپزشک فارم و وضعیت بیماری در منطقه مورد استفاده قرار دهید.

شرایط نگهداری و حمل:

ویال های محتوی واکسن را در دمای ۲ الی ۸ درجه سانتی گراد نگهداری و حمل نمایید.

بسته بندی: واکسن بیولارنگو پی.وی، در ویال های ۱۰۰۰ دزی به همراه حلال (۳۰ میلی لیتری) به بازار عرضه می گردد.

تولید کننده: بوهرینگر اینگلهایم-ایتالیا

توجه: جهت کسب اطلاعات بیشتر به بروشور واکسن مراجعه نمائید.