

نام واکسن : کُرتو



گونه هدف : طیور

نوع واکسن : غیر فعال (سوسپانسیون روغنی)

مورد مصرف : ایجاد ایمنی علیه واریانتهای برونشیت

عفونی طیور CR88 & PL84

نحوه مصرف : تزریقی (زیر جلدی یا عضلانی)

شرایط نگهداری : برودت ۲ الی ۸ درجه سانتی گراد

بسته بندی : بطری های ۱۰۰۰ دزی

تولید کننده : بوهرینگر اینگلهایم-فرانسه



کُرتو، واکسن غیر فعال روغنی

علیه سویه های واریانت برونشیت عفونی طیور CR88121 و PL84084

مشخصات واکسن:

ترکیب: هر دز از واکسن حاوی سروتیپ های زیر می باشد.

* ویروس برونشیت عفونی واریانت PL84084 2.3SNU

* ویروس برونشیت عفونی واریانت CR88121 2.3SNU

موارد مصرف:

به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه افت تولید ناشی از واریانتهای کروناویروس های در پولات های مادر و تخمگذار تجارتي به کار می رود. همچنین به عنوان تقویت کننده سیستم ایمنی بعد از استفاده از واکسن های زنده برونشیت عفونی (سویه ماساچوست) مورد استفاده قرار می گیرد.

روش مصرف:

* به روش تزریق زیرجلدی در ناحیه پشت گردن یا عضلانی در ناحیه سینه تجویز گردد.

مقدار دز مصرفی: در پولات های مادر و تخمگذار تجارتي ۴-۲ هفته قبل از شروع تخمگذاری به میزان ۰/۳ میلی لیتر (یک دُز) برای هر پرنده توصیه می گردد.

شرایط حمل و نگهداری:

بطری های واکسن غیر فعال COR.2 را در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد نگهداری و حمل نمایید.

بسته بندی: واکسن غیر فعال COR.2 در بطری های ۳۰۰ میلی لیتری (۱۰۰۰ دزی) به بازار عرضه می گردد.

تولید کننده : بوهرینگر اینگلهایم- فرانسه

توجه : جهت کسب اطلاعات بیشتر به بروشور واکسن مراجعه نمائید.