



نام واکسن : گالیواک رئو

گونه هدف : طیور

نوع واکسن : زنده - اصلاح شده

مورد مصرف : ایجاد ایمنی علیه عفونت رئو ویروسی در طیور

نحوه مصرف : تزریقی (زیر جلدی)

شرایط نگهداری : برودت ۲ الی ۸ درجه سانتی گراد

بسته بندی : ویال های ۱۰۰۰ دزی به همراه حلال

تولید کننده : بوهرینگر اینگلهایم - ایتالیا



گالیواک رئو

واکسن زنده، تخفیف حدت داده شده و لیوفیلیزه علیه عفونت رئو ویروسی در طیور

مشخصات واکسن:

ترکیب:

هر دز از واکسن شامل حداقل 10^4 TCID₅₀ ویروس تخفیف حدت یافته سویه S1133 می باشد. ویروس واکسینال بر روی کشت سلولی فیروبلاست جنین جوجه SPF تکثیر یافته می باشد.

موارد مصرف:

واکسن گالیواک رئو جهت ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری آرتریت ویروسی در گلهای مادر توصیه می گردد.

نحوه مصرف:

واکسن گالیواک رئو در سنین ۱۰-۸ روزگی و تکرار آن در ۸-۶ هفتگی در گلهای مادر توصیه می گردد. پس از اضافه نمودن واکسن لیوفیلیزه به حلال مقدار ۰/۲ میلی لیتر از واکسن آماده شده را به روش زیر جلدی در ناحیه پشت گردن جوجه تزریق می کنیم. لازم است که واکسن رقیق شده ظرف مدت ۱ ساعت به مصرف برسد.

مصونیت:

ایجاد ایمنی در پرندگان واکسینه شده حدود ۸ الی ۱۰ روز پس از واکسیناسیون گسترش می یابد. بنابراین بسیار مهم است که جوجه ها قبل از در گیری با ویروس فیلد به سطح مطلوبی از ایمنی برسند. به همین دلیل پرندگان جوان باید در اسرع وقت واکسینه شوند و آنها را در سالن های تمیزی که به دقت ضد عفونی شده قرار داده شوند . واکسن گالیواک رئو با برنامه واکسیناسیون تداخل نداشته و در گله ها حفاظت یکنواخت ایجاد می کند. توصیه: واکسن را با توجه به تجویز دامپزشک فارم و وضعیت بیماری در منطقه مورد استفاده قرار دهید.

شرایط حمل و نگهداری:

ویال های محتوی واکسن را در دمای +۲ الی +۸ درجه سانتی گراد و دور از نور حمل و نگهداری نمائید.

بسته بندی:

واکسن گالیواک رئو در ویال های ۱۰۰۰ دزی به همراه حلال ۲۰۰ میلی لیتری به بازار عرضه می گردد.

تولید کننده : بوهرینگر اینگلهایم - ایتالیا

توجه: جهت کسب اطلاعات بیشتر به بروشور واکسن مراجعه نمائید.