


VOLVAC AC PLUS BACTERIN (Aluminum Hydroxide adjuvants)



نام واکسن : وولواک ای.سی.پلاس

گونه هدف : طیور

نوع واکسن : غیر فعال - یاور هیدروکسید آلومینیوم

مورد مصرف : ایجاد ایمنی علیه بیماری کوریزای عفونی

نحوه مصرف : تزریق زیر جلدی در ناحیه گردن

شرایط نگهداری : برودت ۲ الی ۷ درجه سانتی گراد

بسته بندی : بطری های ۵۰۰ میلی لیتری (دزی ۱۰۰۰)

تولید کننده : بوهرینگر اینگلهاپیم - مکزیک

**وولواک ای.سی.پلاس باکترین: واکسن غیر فعال (با یاور هیدروکسید آلومینیوم)
علیه بیماری کوریزای عفونی در ماکیان (*Avibacterium paragallinarum*)**

ترکیب: هر دوز (۵/۰ میلی لیتر) از واکسن شامل 10^8 EID₅₀ سروتیپ های زیر است:

* هموفیلوس پاراگالینارم سروتیپ **SEROTYPE A**

* هموفیلوس پاراگالینارم سروتیپ **SEROTYPE B (with two additional Serotype B variant strains)**

* هموفیلوس پاراگالینارم سروتیپ **SEROTYPE C**

واکسن وولواک ای.سی.پلاس غیر فعال بوده و در یاور هیدروکسید آلومینیوم عرضه می گردد.

موارد مصرف:

- این واکسن برای پیشگیری از بیماری کوریزای عفونی در جوجه ها (مادر و تخمگذار تجارته) توصیه می گردد.
- نوبت اول واکسیناسیون در سن ۶-۴ هفتگی با استفاده از واکسن وولواک ای.سی.پلاس (با یاور هیدروکسید آلومینیوم) ،
- نوبت دوم واکسیناسیون ۴ هفته قبل از شروع تخمگذاری با واکسن وولواک ای.سی.پلاس با یاور امولسیون روغنی، انجام پذیرد.

روش مصرف:

- فلاکن های واکسن را چند ساعت قبل از استفاده از یخچال خارج تا به دمای اتاق (۱۸-۲۵) درجه سانتی گراد برسد و سپس مصرف گردد.
- تزریق مقدار ۰/۵ میلی لیتر (یک دز) از واکسن به روش زیرجلدی در ناحیه یک سوم میانی پشت گردن توصیه می گردد.
- فقط پرندگان سالم را واکسینه نمایید.
- هنگام تلقیح تصادفی در هر ناحیه از بدن پرسنل، توصیه های پزشکی باید انجام شود.

شرایط نگهداری واکسن:

- ویال های واکسن غیر فعال وولواک ای.سی.پلاس را در دمای ۲-۷ درجه سانتی گراد نگهداری و حمل نمایید.
- از انجماد واکسن خود داری شود.

بسته بندی: این واکسن در بطری های پلاستیکی ۵۰۰ میلی لیتری (۱۰۰۰ دزی) به بازار عرضه می گردد.

شرکت تولید کننده : بوهرینگر اینگلهاپیم - مکزیک

توجه: جهت کسب اطلاعات بیشتر به بروشور واکسن مراجعه نمایید.