

جدول راهنمای سریع واکسیناسیون (سن استفاده) در پرندگان
با استفاده از واکسن‌های زنده و کشته بوهرینگر اینگلهایم

جدول راهنمای سریع واکسیناسیون (سن استفاده) در پرندگان با استفاده از واکسن‌های زنده و کشته بوه‌رینگر اینگل‌هایم														
مورد مصرف			روش مصرف											
مرغ مادر	تخم‌گذار تجارتي	جوجه‌گوشي	تلفیح در ناحیه پرده بال	تزریق زیرجلدی یا عضله سینه	تزریق زیرجلدی پشت گردن	آشامیدنی	اسپری	قطره چشمی	سویه واکسینال	نوع واکسن		نام تجاری واکسن	بیماری قابل پیشگیری	سن گله
										زنده	کشته			
•	•				•				HVT + RISPENS نو ترکیب Recombinant		•	بیو مارک BIO MAREK یا پروکسیون آر.آن Prevexxion RN1250	مارک MD	یک‌روزگی
•	•	•				•	•	•	VG/GA STRAIN		•	اوبینو نئو (قرص جوشان) AVINEW Neo	نیوکاسل ND	یک الی هفت روزگی
•	•	•				•	•	•	H120-Mass		•	بیورال H120 نئو (قرص جوشان) Bioral H120 Neo	برونشیت عفونی IB	
•	•	•		•					Ulster 2C STRAIN	•		گالیمون ۲۰۴ Gallimune 204	نیوکاسل ND	
								VNJO			گامبورو IBD			
•	•	•		•					ULSTER 2C H9N2 Updated strain	•		گالیمون H9+ND Gallimune H9+ND Updated strain	نیوکاسل ND آنفلوانزا H9N2	
•	•	•		•					Ulster 2C STRAIN	•		گالیمون H9+ND+IBD Gallimune H9+ND+IBD Updated strain	نیوکاسل ND	
								VNJO STRAIN			گامبورو IBD			
								H9N2 Updated strain			آنفلوانزا H9N2			
•	•			•					Ulster 2C STRAIN	•		گالیمون ۲۰۴ Gallimune 204	نیوکاسل ND	هشت الی ۱۳ روزگی
								VNJO STRAIN			گامبورو IBD			
•				•					S1133 STRAIN		•	گالیواک رئو Gallivac Reo	آرتریت ویروسی Viral arthritis	
		•				•	•	•	PL.21 strain		•	نموواک Nemovac	سندرم تورم سر SHS	

•	•			•					Ulster 2C	•		H9+ND گالیمون Gallimune H9+ND Updated strain	نیوکاسل ND	
									H9N2 Updated strain				آنفلوانزا H9N2	
•	•			•					Ulster 2C STRAIN	•		H9+ND+IBD گالیمون Gallimune H9+ND Updated strain	نیوکاسل ND	
									VNJO STRAIN				گامپورو IBD	
									H9N2 Updated Strain				آنفلوانزا H9N2	
•	•	•			•				H5N1 STRAIN			وولواک پست Volvac B.E.ST (ND+AI.H5)	آنفلونزا فوق حاد H5	هشت الی ۱۳ روزگی و بیشتر
									LASOTA STRAIN				نیوکاسل ND	
•	•	•				•	•	•	S706 STRAIN		•	گالیواک بور اس ۷۰۶ نئو (قرص جوشان) Gallivac BUR S706 Neo	گامپورو IBD	منطقه آلوده: ۱۱ و ۲۱ روزگی
														منطقه غیر آلوده ۱۴ روزگی

Boehringer Ingelheim										جدول راهنمای سریع واکسیناسیون (سن استفاده) در پرندگان با استفاده از واکسن‌های زنده و کشته بوه‌رینگر اینگل‌هایم				
مورد مصرف			روش مصرف					سویه واکسینال	نوع واکسن		نام تجاری واکسن	بیماری قابل پیشگیری	سن گله	
									زنده	کشته				
مرغ مادر	تخم‌گذار تجاری	جوجه‌گوشی	تلقیح در ناحیه پرده بال	تزریق زیرجلدی یا عضله سینه	تزریق زیرجلدی پشت گردن	آشامیدنی	اسپری	قطره چشمی						
•	•	•				•	•	•	S706 INTERMEDIATE	•	گالیواک بور اس ۷۰۶ نئو (قرص جوشان) Gallivac BUR S706 NeO	گامبورو IBD	۲۱-۱۴ روزگی	
•	•	•				•	•	•	H120-Mass STRAIN	•	بیورال H120 نئو (قرص جوشان) Bioral H120 Neo	برونشیت عفونی IB		
•	•	•				•	•	•	VG/GV STRAIN	•	اوینیو نئو (قرص جوشان) AVINEW Neo	نیوکاسل ND		
•	•	•				•	•	•	H120-Mass STRAIN	•	بیورال H120 نئو (قرص جوشان) Bioral H120 Neo	برونشیت عفونی IB	۲۸-۲۲ روزگی	
•	•	•				•	•	•	VG/GA STRAIN	•	اوینیو نئو (قرص جوشان) AVINEW Neo	نیوکاسل ND		
•	•		•						HP2-Fowl Pox	•	بیو پاکس Bio Pox	آبله مرغی POX	چهار الی شش هفتگی	
•	•							•	PV.09 strain	•	بیو لارنگو Bio Laryngo	لارنگوتراکئیت ILT		
•	•				•				HAEMOPHILUS A, B, C + 2 B Variants (ALOH)	•	ولواک ای‌سی Volvac AC	کوری‌زای عفونی		
•					•				S1133 STRAIN	•	گالیواک رئو Reo GALLIVAC	آرتریت ویروسی Viral arthritis	شش الی هشت هفتگی	
•	•			•					S. ENTERITIDIS S. TYPHIMURIUM	•	گالیمون اس‌ئی + اس‌تی GALLIVAC SE+ST	سالمونلوز		
•	•					•			PL.21 STRAIN	•	نمواک NEMOVAC	سندرم تورم سر SHS		
•	•	•	•	•				Ulster 2C STRAIN	•		گالیمون H9+ND+IBD Gallimune H9+ND+IBD Updated strain	نیوکاسل ND		
								VNJO STRAIN				گامبورو IBD		
								H9N2 Updated strain				آنفلوانزا H9N2		
•	•					•	•	•	VG/GA STRAIN	•	اوینیو نئو (قرص جوشان) AVINEW Neo	نیوکاسل ND		
•	•					•	•	•	H120 –MASS STRAIN	•	بیورال H120 نئو (قرص جوشان) Bioral H120 Neo	برونشیت عفونی IB		

•	•		•					HP2-Fowl Pox STRAIN		•	Bio Pox	بیو پاکس	آبله مرغی POX	نُه الی ۱۳ هفتگی
•	•			•				HAEMOPHILUS A, B, C TYPES	•		BIO-AD-COR3	یا	کریزای عفونی IC	
•	•				•			HAEMOPHILUS A, B, C TYPES + 2 B. Variants(ALOH)			ولواک ای سی Volvac AC			
•	•					•		Calnek.1143 STRAIN		•	Bio EA	بیوئی آ	آنسفالومیلیت پزندگان AE	۱۳-۱۴ هفتگی
•	•					•		PL.21 STRAIN		•	NEMOVAC	نموواک	سندرم تورم سر SHS	

جدول راهنمای سریع واکسیناسیون (سن استفاده) در پرندگان
با استفاده از واکسن‌های زنده و کشته بوه‌رینگر اینگل‌هایم

مورد مصرف			روش مصرف											
مرغ مادر	تخم‌گذار تجارتي	جوجه‌گوشني	تفليح در ناحیه پُرده بال	تزريق زیرجلدي يا عضله سينه	تزريق زیرجلدي پشت گردن	آشاميدني	اسپري	قطره چشمي	سویه واکسینال	نوع واکسن		نام تجاری واکسن	بیماری قابل پیشگیری	سن گله
										زنده	کشته			
	•			•					ULSTER 2C STRAIN	•		گالیمون ۲۰۱ GALLIMUNE 201 IBD+Reo	نیوکاسل ND	۱۶-۲۰ هفتگی
									S1133 STRAIN				رئو Reo	
•	•			•					ULSTER 2C STRAIN	•		گالیمون ۲۰۴ GALLIMUNE 204 ND+IBD	نیوکاسل ND	
									VNJO STRAIN				گامبورو IBD	
•	•			•					ULSTER 2C STRAIN	•		گالیمون ۲۰۸ GALLIMUNE 208 ND+AL.H9N2	نیوکاسل ND	
									VNJO STRAIN				گامبورو IBD	
•	•			•					ULSTER 2C STRAIN	•		گالیمون ۳۰۲ GALLIMUNE 302 ND+IB+EDS	نیوکاسل ND	
									M41 STRAIN				برونشیت عفونی IB	
									EDS.127 STRAIN				سندرم کاهش تولید EDS	
•	•			•					ULSTER 2C STRAIN	•		گالیمون H9+ND GALLIMUNE H9+ND	نیوکاسل ND	
									H9N2 Updated strain				آنفلوانزا H9N2	
•	•			•					ULSTER 2C STRAIN	•		گالیمون H9+ND+IBD Gallimune H9+ND+IBD Updated strain	نیوکاسل ND	
									VNJO STRAIN				گامبورو IBD	
									H9N2 Updated strain				آنفلوانزا H9N2	
•	•			•					ULSTER 2C STRAIN	•		گالیمون ۴۰۷ GALLIMUNE 407 (ND+IB+EDS+ART)	نیوکاسل ND	
									M41 STRAIN				برونشیت عفونی IB	
									EDS.127 STRAIN				سندرم کاهش تولید EDS	
									VCO3 STRAIN				رینوتراکثیت ART	
•	•			•	•				- LASOTA STRAIN - M41 STRAIN			ولوآک ای‌سی پلاس Volvac AC Plus ND+IB+EDS	کوریزای عفونی IC نیوکاسل ND برونشیت IB	

									EDS127 STRAIN- - HAEMOPHILUS A, B, C	•		یا گالیمون ۵۰۳ GALLIMUNE 503	سندرم کاهش تولید EDS	
									VG/GA STRAIN- - M41 STRAIN - EDS127 STRAIN - HAEMOPHILUS A, C					
•	•			•	•				HAEMOPHILUS A, B, C +2 B variant	•		ولواک ای سی Volvac AC یا بیو.آد.کر-۳ BIO-AD-COR3	کُریزای عفونی IC	
									HAEMOPHILUS A, B, C (ALOH)					

توجه:

جدول راهنمای سریع با توجه به امکان استفاده از واکسن های بوهرینگر اینگلهایم در سنین مناسب در گله های پرورشی (جوجه گوشتی، مادر و تخمگذار تجارتي) و برای شرایط متعارف جهت پیشگیری از بیماری ها تدوین گردیده است، لذا برنامه فوق پیشنهادی است، بنابراین ضروری است برنامه واکسیناسیون با توجه به نظر دامپزشک واحد مرغداری تدوین و اجرا شود. دامپزشک واحد مرغداری می تواند با توجه به میزان آنتی بادی موجود در خون پرنده، میزان آلودگی در محیط، وضعیت شیوع بیماری ها در منطقه (**High or Low risk area**) و میزان حدت ویروس های شناسایی شده در منطقه، تغییرات لازم را در برنامه واکسیناسیون و انتخاب نوع واکسن های مصرفی اعمال کند. واکسن های زنده قرص جوشان، برونشیت **Gallivac IB88 NeO**، گامبورو **Gallivac Bur 706 Neo**، برونشیت **Bioral H120 Neo** و نیوکاسل **Avinew Neo** را می توان با هر سه روش اسپری، قطره چشمی و آشامیدنی در گله مصرف کرد. تأکید می شود، با توجه به تاثیر بهتر روش های اسپری و قطره چشمی نسبت به روش آشامیدنی در سنین پایین، سعی شود از دو روش مذکور استفاده شود. واکسن های زنده قرص جوشان برونشیت **H120** و **IB88** و **BUR706** و نیوکاسل را به لحاظ سازگاری می توان با توجه به دستورالعمل شرکت بوهرینگر با هم مخلوط و به روش های ذکر شده در پرندگان مصرف کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص واکسن های بوهرینگر اینگلهایم به سایت **pilvarad.com** مراجعه فرمایید.